COSMOLOGÍA OBSERVACIONAL

El estado actual de las observaciones cosmológicas

Eusebio Sánchez
División de astrofísica de partículas
CIEMAT (Madrid)

Curso "400 años de astronomía moderna"
La Granja, julio de 2009

Contenidos

- El modelo cosmológico estándar
- La radiación cósmica de fondo (CMB)
- Telescopios y detectores
- Distancias: Constante de Hubble
- Materia Oscura
- Energía oscura
- Conclusiones



La cosmología trata de las escalas espaciales más grandes.

El universo visible completo

Instruments

Observables

Accelerators
LHC, LEP

(Particle beams)
Electron
Microscope
Microscope

Telescope

Radio
Telescope

10^{-34}
10^{-30}
10^{-26}
10^{-22}
10^{-18}
10^{-14}
10^{-10}
10^{-6}
1m
10^{6}
10^{10}
10^{14}
10^{18}
10^{22}
10^{26}

SUSY particle?
Higgs? (range of nuclear force)
Z/W
Proton (range of weak force)
Nuclei
Atom
Virus
Cell

Earth radius
Earth to Sun



Galaxies
Radius of observable
Universe

Modelo espacial a escala:

El sistema solar a escala $1/10^{12}$ cabe en un salón, con el Sol siendo una bombilla de 100 W

La estrella más cercana sería otra bombilla a unos 40 km

La galaxia serían 100000 millones de bombillas extendidas en un disco de radio igual al de la órbita de la Luna, con un grosor igual al diámetro de la Tierra (100000 millones de granos de arroz llenan un almacén del tamaño de una catedral)

El límite del universo visible llegaría hasta 1/30 de la distancia a la estrella más cercana

Las escalas también son gigantescas en el tiempo: Espacio y tiempo están relacionados. Mirar a grandes distancias es mirar a tiempos remotos



Calendario cósmico “a la Carl Sagan”

El modelo estándar de la cosmología: El Big Bang

Idea fundamental: El universo empezó con una gran explosión y desde entonces se está expandiendo y enfriando

Cómo es el universo actual depende de los detalles de la gran explosión y del contenido del universo en energía y materia

Se puede reconstruir la historia del universo estudiando cómo es hoy en día



El modelo estándar de la cosmología: El Big Bang

Los objetos se alejan porque el espacio se expande, pero los objetos no se hacen más grandes

La expansión es consecuencia del big bang

La velocidad de expansión depende del contenido en energía del universo





BASES DE LA COSMOLOGÍA

- Las galaxias se alejan unas de otras: ***Corrimiento al rojo (REDSHIFT)***

- La abundancia de elementos ligeros: La mayor parte del universo es hidrógeno y helio

- La radiación de fondo (CMB): El residuo en radiación de la creación de la materia. Es el 1% del ruido que se ve en un televisor mal sintonizado

- La distribución de materia a gran escala (LSS): Las galaxias se distribuyen en cúmulos y vacíos

- Las supernovas de tipo Ia: Nos permiten conocer cómo es la expansión del espacio

- Los movimientos de los objetos (rotación de galaxias, cúmulos…): Nos permiten conocer la distribución de materia, porque están controlados por la fuerza de la gravedad







¿Cómo se observa todo esto?

Potentes telescopios tanto en tierra como en el espacio

En muy diferentes longitudes de onda (no solamente luz visible)

También se observan otras partículas que vienen del espacio

Parámetros cosmológicos

Utilizando la teoría de la relatividad general de Einstein, el universo se puede describir usando una serie de parámetros (densidades de energía, materia y radiación, curvatura, energía del vacío…)

Dependiendo de sus valores, la geometría del universo será abierta, cerrada o plana

Al valor de la densidad que hace la geometría plana se le llama densidad crítica

Dependiendo de las proporciones de cada tipo, el universo se expandirá para siempre o colapsará sobre sí mismo en el futuro.



Cosmic Pie



© Rocky Kolb


The Expansion of the Universe
Galaxy Formation
Over billions of years, gravity draws matter together into a web of structure. The bright spots are where galaxies form.
Size of the Universe
Not to scale
Matter dominates: Expansion slows
Dark energy dominates: Expansion speeds up
Big Bang
Today
Time 0
1.0
9.5
13.7
Not to scale; In billion years
Energy and Matter Content
Dark Energy
1%
Dark Matter
84%
Ordinary Matter
15%
50%
43%
7%
73%
23%
4%


Atoms 4.6%
Dark Energy 72%
Dark Matter 23%
TODAY
Neutrinos 10 %
Dark Matter 63%
Photons 15 %
Atoms 12%
13.7 BILLION YEARS AGO
(Universe 380,000 years old)

LA GRAN SORPRESA: EL LADO OSCURO DEL UNIVERSO



CMB dice que el universo tiene la densidad crítica → Geometría plana

LSS dice que no hay suficiente materia para llegar a la densidad crítica... Y QUE LA MAYOR PARTE DE LA MATERIA DEL UNIVERSO ES DIFERENTE A LA QUE HAY EN LA TIERRA!!!!!!

SNIa dicen que la densidad que falta es... DE GRAVEDAD REPULSIVA!!! → Energía Oscura

El descubrimiento más importante de los últimos años en cosmología y en física en general

Valores de los parámetros cosmológicos más importantes tras los resultados de WMAP3

Old Universe - *New* Numbers

$\Omega_{tot} = 1.02 \pm 0.02$

$w < -0.78$ (95% CL)

$\Omega_\Lambda = 0.73 \pm 0.04$

$\Omega_b h^2 = 0.0224 \pm 0.0009$

$\Omega_b = 0.044 \pm 0.004$

$n_b = (2.5 \pm 0.1) \times 10^{-7} \mathrm{cm}^{-3}$

$\Omega_m h^2 = 0.135 \,^{+0.008}_{-0.009}$

$\Omega_m = 0.27 \pm 0.04$

$\Omega_\nu h^2 < 0.0076$ (95% CL)

$m_\nu < 0.23$ eV (95% CL)

$T_{cmb} = 2.725 \pm 0.002$ K

$z_r = 20 \,^{+10}_{-9}$ (95% CL)

$t_r = 180 \,^{+220}_{-80}$ Myr (95% CL)

$r(k_0 = 0.002 \mathrm{Mpc}^{-1}) < 0.71$ (95% CL)

$A(k_0 = 0.05 \mathrm{Mpc}^{-1}) = 0.833 \,^{+0.086}_{-0.083}$

$n_\gamma = 410.4 \pm 0.9 \mathrm{cm}^{-3}$

$n_s = 0.99 \pm 0.04$ (WMAP only)

$n_s(k_0 = 0.05 \mathrm{Mpc}^{-1}) = 0.93 \pm 0.03$ with $dn_s/d \ln k = -0.031 \,^{+0.016}_{-0.018}$

$\eta = (6.1 \,^{+0.3}_{-0.2}) \times 10^{-10}$

$\Omega_b \Omega_m^{-1} = 0.17 \pm 0.01$

$\sigma_8 = 0.84 \pm 0.04$

$\sigma_8 \Omega_m^{0.5} = 0.44 \,^{+0.04}_{-0.05}$

$z_{dec} = 1089 \pm 1$

$\Delta z_{dec} = 195 \pm 2$

$h = 0.71 \,^{+0.04}_{-0.03}$

$r_s = 147 \pm 2$ Mpc

$d_C = 14.0 \,^{+0.2}_{-0.3}$ Gpc

$\theta_A = 0.^\circ598 \pm 0.^\circ002$

$l_A = 301 \pm 1$

$t_0 = 13.7 \pm 0.2$ Gyr

$t_{dec} = 379 \,^{+8}_{-7}$ kyr

$\Delta t_{dec} = 118 \,^{+3}_{-2}$ kyr

$z_{eq} = 3233 \,^{+194}_{-210}$

$\tau = 0.17 \pm 0.04$

These "best" cosmological parameter values are from a combination of a wide variety of cosmological measurements, including the WMAP, COBE, CBI, and ACBAR CMB measurements and 2dFGRS, HST, SNIa, and Lyman-alpha forest measurements.

LA GRAN SORPRESA: EL LADO OSCURO DEL UNIVERSO

“No entendeis el poder del lado oscuro” (Darth Vader, Star Wars, epidodio 3)

“No os dejeis cegar por esas luces... El lado oscuro controla el universo. La materia oscura lo mantiene unido. La energía oscura determina su destino final.” (Michael Turner)

El 95% del contenido en materia-energía del universo es desconocido. El Modelo Estándar de las partículas elementales describe solamente el 5% restante.

La energía oscura es tan extraña que provoca una fuerza de gravedad repulsiva, y esto hace que la expansión del universo no se frene sino que se acelere.

El universo plano: LA RADIACIÓN DE FONDO DE MICROONDAS

Brillo residual de la aparición de la materia tal y como la conocemos. Todavía se puede observar, pero no en luz visible. Se ha enfriado debido a la expansión del universo

Procede de cuando el universo tenía 380000 años. Es decir, de hace unos...¡¡¡ 13600 millones de años!!! (Si el universo fuera una persona de 80 años, la CMB sería una foto de cuando tenía 13 meses!)

Se descubrió en 1965 por Penzias y Wilson (NOBEL)

Se confirmó que no era completamente uniforme en 1992 por COBE (NOBEL). Sus pequeñas anisotropías son la huella del origen de todas las estructuras que vemos ahora (Galaxias, estrellas, humanos...)

Da la estimación más precisa de los parámetros cosmológicos actualmente, por WMAP. Un nuevo satélite lanzado en mayo para realizar medidas aun más precisas, PLANCK.



Resumen injusto con otros muchos experimentos muy importantes: Boomerang, maxima, dasi, vsa, spt, apex… Pero no tenemos tiempo para revisarlos todos.



HORN ANTENNA
HAS BEEN DESIGNATED A
NATIONAL HISTORIC LANDMARK
THIS SITE POSSESSES NATIONAL SIGNIFICANCE IN COMMEMORATING THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA. SCIENTISTS ARNO PENZIAS AND BOB WILSON WITH THE ANTENNA FOUND THE EVIDENCE CONFIRMING THE "BIG BANG" THEORY OF THE CREATION OF THE UNIVERSE, FOREVER CHANGING THE SCIENCE OF COSMOLOGY.
1989
NATIONAL PARK SERVICE
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

El Satélite COBE



El instrumento FIRAS, que midió la temperatura de la CMB con enorme precisión







El instrumento DMR, que detectó por primera vez las fluctuaciones de la CMB





The 9.6 mm DMR receiver partially assembled. Corrugated cones are antennas.



WMAP empezó su misión en 2001 y aun está funcionando en punto lagrangiano L2



Ha producido las medidas más precisas hasta la fecha en cosmología, que han permitido situar la teoría cosmológica sobre bases observacionales sólidas






23GHz
33GHz
41GHz
61GHz
94GHz



La resolución angular de WMAP es mucho mejor que la de COBE, por lo que permite obtener mucha más información de las fluctuaciones en la CMB.

El espectro de potencias de la CMB según las medidas de WMAP. La línea roja es el ajuste al modelo cosmológico y la banda gris es el margen de error



1965

Penzias and Wilson



1992

COBE



2003

WMAP





La próxima medida vendrá de Planck, que llegó al punto lagrangiano L2 ~7 de julio de 2009. Hará medidas más precisas que WMAP y además es sensible a la polarización de la CMB



Cómo medir la cosmología utilizando la CMB:

- Se mide la distribución de temperatura de la CMB
- Se construye un mapa de las anisotropías
- A partir del mapa se obtiene el espectro de potencias
- Del espectro de potencias se sacan los parámetros cosmológicos



El lado oscuro del universo

Cómo intentar entender la energía oscura y la materia oscura

- Para intentar entender el lado oscuro del universo se hacen muchas observaciones diferentes. En todas ellas, los instrumentos fundamentales son los telescopios y las cámaras, que vamos a describir a continuación.

- Se infieren las propiedades de los componentes oscuros a partir del comportamiento de los objetos visibles (fundamentalmente galaxias).

- Aunque también hay un enorme esfuerzo en marcha para intentar detectar en el laboratorio la materia oscura, para poder preparar experimentos y estudiar sus propiedades con mayor precisión.

- Hasta ahora no se ha podido detectar materia oscura y no se sabe lo que es. De la energía oscura se sabe menos aun. La cosmología es una ciencia que tiene mucho camino (y muy interesante) por recorrer en los próximos años.

De las imágenes a la cosmología

Para obtener resultados científicos es necesario tener en cuenta todos los procesos que ocurren desde que la luz es emitida por la fuente hasta que se transforma en la medida de los parámetros cosmológicos



La fuente

Atmósfera: seeing, ...

Telescopio + óptica: PSF...

Cámara + electrónica + DaQ

Tratamiento de datos (Pipeline)

Análisis y medidas científicas

Tipos de observaciones astronómicas

La información que obtenemos del universo llega en forma de partículas: fotones (luz), partículas cargadas (rayos cósmicos), neutrinos (y, supuestamente, ondas gravitacionales y materia oscura)

Aquí nos concentramos en la medida de fotones (visibles o en el NIR)

Hay muchos tipos de observaciones: Imágenes, espectros, fondo de cielo…

En general en todas se mide de diferentes maneras el número de fotones como función de la energía, la posición, el tiempo o el estado de polarización.

Las cantidades derivadas de estas medidas son

- La tasa de cuentas: número de fotones/segundo
- Flujo: Número de fotones/segundo/unidad de area del detector
- Espectro: Fotones/unidad de energía
- Densidad de flujo espectral: Julios/segundo/unidad de área/unidad de frecuencia
- Brillo de superficie: Julios/segundo/unidad área/unidad frecuencia/unidad ángulo sólido

Medida de la señal en el detector → Propiedades de los fotones → Propiedades de la fuente astronómica → Parámetros cosmológicos

La luz se recibe en grandes telescopios situados en los lugares donde el cielo ofrece mejores condiciones de observación.

Telescopio Blanco (4 m) en Cerro Tololo (Chile):



Blanco Shutdown 2009 Fri May 29 13:17:48 2009
Exposure: 6800
El telescopio Blanco
dentro de la cúpula

Los parámetros más importantes de un telescopio son el area colectora de luz (más área implica más luz y ver más lejos) y el campo de visión (más campo implica más objetos en cada exposición)





Diferentes tipos de telescopios según la disposición de los espejos.

Los instrumentos de medida se colocan en el punto focal del telescopio



El primer detector astronómico

El ojo: Sistema completo de telescopio (de apertura variable, ~1 cm max), detector y procesador de datos



Retina: Sensible a la luz a través de un proceso químico

Bastones: 100 millones, 2μm de tamaño, detectan niveles muy bajos de luz

Conos: dan la información sobre el color, 7 million, 1000 por mm^2

Reutilizable: tiempos de integración de ~100 ms

PROBLEMAS (para hacer astronomía)

No se almacenan las observaciones para comprobar resultados

No se pueden hacer medidas precisas (posición, magnitud, etc) porque las observaciones no se almacenan o digitalizan

El tiempo de integración es corto, los objetos débiles no se ven sin usar telescopios cada vez mayores

MUCHOS DESCUBRIMIENTOS!!!

Ojos desnudos:

Nomenclatura: Constelaciones, estrellas
Astrometría: Posiciones estelares
Escala de magnitudes
Planetas and órbitas (Tycho, Kepler)
Cometas
Explosiones de Supernovas
Estrellas variables
Manchas solares (China 800 B.C.)
Corona solar (eclipses)
Fases lunares
Cúmulos estelares (e.g. Pléyades)

Con telescopios:

Ciclo de las manchas solares,
anillos de Saturno,
mancha roja de Júpiter,
nebulosas, nebulosas espirales
paralaje, medidas astrométricas,
asteroides,
lunas de la mayoría de los planetas,
cráteres de la Luna

Placas fotográficas

Las placas fotográficas fueron los primeros detectores bidimensionales

Ventajas de las placas fotográficas:

Amplio campo de visión. Hasta 3 sq-deg

Resolución, mejor que un CCD de la misma área

Desventajas de las placas fotográficas:

Muy baja eficiencia cuántica. Las mejores tienen una QE en torno al 3%

Necesitan tiempos de exposición muy largos, uso ineficiente del tiempo

Sensibles a fallos. Se hacen menos efectivas cuando el tiempo de exposición crece

Sensibilidad no lineal al color. Las placas son más sensibles a la luz azul

Almacenamiento. Frágiles y ocupan mucho espacio. Se degradan con la edad.

Digitalización. Deben escanearse para tener datos en formato digital.

Tubos fotomultiplicadores



En 1907 Joel Stebbins comenzó el uso de los tubos fotomultiplicadores en astronomía

Desventajas de los tubos fotomultiplicadores:

- Deben funcionar con voltajes muy altos
- Niveles de luz muy altos pueden destruir el tubo
- No son muy eficiente sen la región óptica del espectro: 3500 to 10.000 Å

CCD: Charge Coupled Device

- Se desarrollaron en los in 1960s como dispositivos de alamacenamiento en memorias
  - Su sensibilidad a la luz sugería el uso para recoger imágenes
- En los 1970s, CCDs se usaron de forma experimental
- En los 1980s su uso se extendió ampliamente
- En los 1990s habían copado completamente todas las aplicaciones de construcción de imáenes (videos, cámaras, scanners, *etc.)*
- La astronomía es una aplicación muy exigente con los detectores
  - Bajo nivel de luz
  - Exigencia de ruido muy bajo
  - Sin defectos cosméticos



Los CCDs funcionan convirtiendo la luz en un patrón de carga eléctrica en un chip de silicio. Este patrón de carga sedigitaliza y se almacena como un fichero de imagen en un ordenador.

Unidad básica de un CCD



Elemento base:

Dispositivo semiconductor

Depletion region bajo el electrodo central (que es de carga positiva y los otros son de carga negativa) → Pozo de potencial muy profundo para atrapar electrones

Los fotoelectrones generados bajo el electrodo central son atraidos hacia el electrodo y almacenados. Los correspondientes huecos se difunden en el silicio circundante.

¿Cómo funcionan los CCDs? – transferencia de carga

Analogía de la operación de un CCD: Cinta de trasnporte de agua

LLuvia = Luz de la fuente emisora

Transporte de agua = Transferencia de carga

Medida del nivel de agua = Medida de la carga depositada

- Recoger luz
- Transferir carga
- Medir carga



Cómo funciona un CCD

Se convierte la luz (fotones) en carga eléctrica (electrones) utilizando el efecto fotoeléctrico en una capa de silicio.

La carga se acumula en pozos de potencial durante la exposición a la luz.

El CCD se lee al final de la exposición – la carga se transfiere al registro de salida.



Los CCDs científicos más habituales tienen 2048x2048 or 2048x4096 píxeles

CCD versus Placa fotográfica



Placa

3 x 3 grados (algo menos ya que la imagen se recorta) en una exposición

Coste: 100 €

Requeriría un telescopio de 20 m para detectar el mismo número de fotones que un CCD

CCD

1/9 covertura

Coste: 120.000 €, ~1.000.000 € para cubrir el mismo campo

Coste por exposición sobre la vida del dispositivo: < 1 €

Astronomical cameras: Mosaicos of CCDs

- Los CCDs son pequeños → Construir mosaicos

- Varios CCDs en el mismo plano

- Las mayores cámaras actuales tienen ~30 CCDs. La próxima generación serán mucho mayores (DES, PanStarrs…)

- Aparecen nuevos problemas: Colocar los CCDs en el mismo plano con precisión mejor que 1 micra, electrónica para leer varios CCDs, cross-talk, criogenia, vacío, interfaz con el telescopio...

- Nuevos diseños de CCDs para minimizar los huecos entre ellos y cubrir el plano de la forma más eficiente posible

Ejemplos de cámaras CCD: MegaCam

40 CCDs (20k x 18k píxeles)

Instalada en un telescopio de 3.6 m (CFHT)

1 grado cuadrado de campo de visión

3 partes principales:

Mosaico de CCDs (plano focal)

Sistema térmico: Temperatura uniforme en el plano focal

Sistema mecánico: altamente integrado, dilataciones, vacío, mantenimiento de los CCDs

Esquema de una cámara astronómica





Cómo obtener resultados a partir de las imágenes

2 tipos fundamentales de medidas: Obtener el espectro completo de los objetos (extremadamente costoso en tiempo y se necesitan telescopios muy grandes) u obtener los colores de los objetos en bandas anchas de longitud de onda (se obtiene para todos los objetos, pero la información es menor)



Para obtener medidas cosmológicas a partir de las imágenes tenemos que:

- Identificar cada objeto: Usando su espectro (asequible) o sus colores (Difícil)
- Medir su posición en el cielo: A través de las imágenes calibradas (Asequible)
- Medir la distancia a la que se encuentra: **Redshift** (asequible con espectro, muy difícl con colores)

Medida del redshift



Redshift espectroscópico:

-Muy preciso, localizando la posición de las líneas

- Extremadamente costoso: >45 minutos por objeto

Redshift fotométrico:

-Menos preciso, midiendo el flujo contenido en regiones de longitud de onda

- Se puede obtener para todos los objetos de una imagen en ~55 segundos







http://adc.gsfc.nasa.gov/mw

Multiwavelength Milky Way

Medida de distancias en cosmología

Cada rango de distancias se va calibrando con el anterior



La constante de Hubble

La constante de Hubble nos da la velocidad de expansión del universo. Su medida ha mejorado muchísimo gracias a las nuevas tecnologías.

El mejor valor actual (2009) es

h_0=74.2 ± 3.6 km/s/Mpc







Materia Oscura: Evidencias de su existencia

La existencia de la materia oscura se infiere de muchas medidas muy diferentes.

La primera evidencia surgió en la década de los años 30, y desde entonces no ha hecho más que crecer. Algunas de las medidas que muestran la necesidad de la existencia de materia oscura son:

- **Curvas de rotación de las galaxias (espirales) o dispersión de velocidades (elípticas)**
- **Relación masa luminosidad en cúmulos de galaxias**
- **Lentes gravitacionales**
- **La estructura a gran escala del universo**
- **Nucleosíntesis primordial (DM es no bariónica)**

Evidencias de materia oscura: Curvas de rotación de galaxias



Se mira el redshift de las diferentes zonas de una galaxia espiral. Un lado se acerca (blueshift) y el otro se aleja (redshift). De esos valores se saca la velocidad de rotación



Para las estrellas visibles se esperaría que la velocidad disminuyese con la distancia al centro, pero se ve que se mantiene constante! → **En las galaxias hay más materia que la que se ve**





MEDIDO

¡¡MATERIA OSCURA!!

Evidencias de materia oscura: Relación masa-luminosidad



Hay mucha más masa en los cúmulos de galaxias que la que se puede ver

Masa de cúmulos de galaxias:

- Dinámica de galaxias en cúmulos (teorema del virial)
- Temperatura del gas intracumular (rayos-X)
- Lentes gravitacionales

Materia que no está en forma de estrellas o gas→

¡¡¡MATERIA OSCURA!!!!





1 peculiar velocities; 2 weak lensing; 3 shear correlations; 4 local group; 5 baryon mass fraction; 6 cluster mass function; 7 virgocentric flow; 8 mean relative velocities; 9 redshift space distorsions; 10 mass power spectrum; 11 ISW effect; 12 angular diameter distance SNe; 13 cluster baryon fraction

Evidencias de materia oscura: Lentes gravitacionales











Einstein Ring Gravitational Lenses

Hubble Space Telescope ▪ ACS



NASA, ESA, A. Bolton (Harvard-Smithsonian CfA), and the SLACS Team

STScI-PRC05-32





Evidencias de materia oscura: Estructura a gran escala



Diferentes contenidos de materia-energía predicen diferentes niveles de estructura en el universo.

Solamente con materia y energía oscuras se puede entender la estructura presente.







La cosmología ΛCDM, con un ~75% de energía oscura y un ~25% de materia total es capaz de describir la formación de estructuras en el universo

La materia oscura no es bariónica: Nucleosíntesis primordial

$$d + d \longrightarrow He^3 + n$$

$$d + d \longrightarrow H^3 + p$$

$$H^3 + d \longrightarrow He^4 + n$$

$$He^3 + d \longrightarrow He^4 + p$$





- Duró un poco más de un cuarto de hora y se formaron los elementos ligeros primordiales (desde el minuto ~3 al ~20 tras el Big Bang)
- Controlada por el número de fotones por barión.
- Las leyes físicas y constantes que gobiernan la materia a las energías correspondientes son bien conocidas, no es física especulativa.
- CMB y medida de abundancias primordiales:

D→Líneas de abdorción en QSOs

^{4}He→Regiones extragalácticas HII de baja metalicidad (junto con O/H y N/H). ^{4}He vs O/H es constante, ^{4}He es primordial

Li→Estrellas enanas del halo de baja metalicidad, gran error sistemático

¿Qué sabemos de la materia oscura?

- **La materia oscura es fría:** Partículas que se mueven muy despacio (no relativistas), normalmente porque son muy masivas.
- **El crecimiento de estructuras es bottom-up**, los cúmulos y supercúmulos de galaxias todavía se están formando hoy en día.
- Los **neutrinos** son **una parte muy pequeña** de la materia oscura.

Muchos candidatos teóricos posibles, pero aun no ha sido encontrada



Materia oscura: Búsqueda. Métodos de detección directa

Experimentos bajo tierra que buscan la interacción de partículas de materia oscura con un blanco. Ejemplo:

CRYOGENIC DARK MATTER SEARCH: DETECTING WIMPs IN THE CDMS EXPERIMENT











Materia oscura: Búsqueda. Métodos de detección indirecta

Telescopios de diferentes tipos que buscan los productos de la aniquilación de partículas de materia oscura (rayos gamma, antimateria, neutrinos…). En tierra, en el espacio, bajo el mar…

Una posibilidad abierta (para LHC) sería producirla en aceleradores, cosa que hasta ahora no ha sido posible.







Materia oscura: Producción



Es posible que se produzca materia oscura en el colisionador de protones LHC en el CERN (Ginebra, Suiza).

El mayor acelerador jamás construido (27 km de circunferencia)

Empezará a funcionar en breve



ENERGÍA OSCURA: ¿Qué sabemos de la energía oscura?

1) **No emite (ni absorbe) radiación electromagnética (es oscura)**
2) **Tiene una presión negativa grande**
3) **Su distribución en el espacio es homogénea. La energía oscura no se agrupa de manera significativa en escalas tan grandes (al menos) como los cúmulos de galaxias**

La energía oscura es muy diferente de la materia oscura. Su presión es comparable en magnitud a su densidad de energía (es tipo energía) mientras que la materia se caracteriza por tener presión nula (o despreciable).

La energía oscura es un fenómeno difuso, que interacciona muy débilmente con la materia y de muy baja energía. Por lo tanto, será extremadamente difícil (si es que es posible) producirla en aceleradores. Puesto que no se acumula en las galaxias o en los cúmulos de galaxias, el universo al completo es el laboratorio natural (y posiblemente, el único posible) para su estudio.

No existen explicaciones teóricas bien fundadas para la energía oscura.

Los próximos avances en su conocimiento vendrán, casi con toda probabilidad, de las mejoras en la observación.

Pruebas observacionales de la energía oscura

Candelas estándar

Reglas estándar



Se trata de identificar la naturaleza de la energía oscura midiendo el parámetro w como función del redshift.

Es necesario medir con gran precisión, puesto que las diferencias entre diferentes modelos son muy pequeñas.

¡¡¡¡Control de los errores sistemáticos!!!!



Pruebas observacionales de la energía oscura

El DETF identificó 4 métodos como los más prometedores actualmente y en el futuro cercano:









Supernovae Ia

Con esta técnica se descubrió la energía oscura en 1998.

Es la técnica mejor conocida y más desarrollada hasta la fecha

SN Ia son MUY BUENOS INDICADORES DE DISTANCIAS



Estrategia de búsqueda

- Rolling search
- Mirar sistemáticamente la misma área en el cielo

Clasificación

- Obtener espectros y colores de todas las supernovae (como sea posible)

Obtener las curvas de luz

- En muchos colores

Classification of Supernovae

Spectral Type	Ia	Ib	Ic	II
Spectrum	No Hydrogen			Hydrogen
	Silicon	No Silicon		
		Helium	No Helium	
Physical Mechanism	Nuclear explosion of low-mass star	Core collapse of evolved massive star (may have lost its hydrogen or even helium envelope during red-giant evolution)		
Light Curve	Reproducible	Large variations		
Neutrinos	Insignificant	~ 100 × Visible energy		
Compact Remnant	None	Neutron star (typically appears as pulsar) Sometimes black hole ?		
Rate / h^2 SNu	0.36 ± 0.11	0.14 ± 0.07		0.71 ± 0.34
Observed	Total ~ 2000 as of today (nowadays ~ 200/year)			

Georg Raffelt, Max-Planck-Institut für Physik, München, Germany

Supernova 1987a

Supernova Ia



Las supernovas se son el resultado de la muerte violenta de estrellas muy masivas

Son extraordinariamente brillantes, por eso se pueden ver a largas distancias

Las supernovas tipo Ia son estandarizables, puesto que se producen en la explosión termonuclear de enanas blancas en sistemas binarios con gigantes rojas.

SN2002dd in the Hubble Deep Field North **HST** ▪ WFPC2 ▪ ACS

NASA and J. Blakeslee (Johns Hopking University) STScI-PRC03-12

Supernovae Ia

Las SN Ia son MUY BUENOS INDICADORES DE DISTANCIA

No son candelas estándar de origen, pero son perfectamente estandarizables

Se calibran usando sne cercanas, cefeidas y modelos fenomenológicos





Relacionar la forma de la curva de luz con la luminosidad: En los últimos años se han desarrollado modelos fenomenológicos (SALT2, MLCS2k2) mucho más precisos que las correcciones que se usaron inicialmente y permiten determinar las distancias con precisiones del por ciento.

Supernovae Ia

Una vez obtenidas las luminosidades, se construye el diagrama de Hubble

$\mu = m - M = 5 \log_{10}(d_L/10\ \mathrm{pc})$ → distance modulus

$$D_L = \sqrt{\frac{L}{4\pi F}}$$

Distancia por luminosidad: L=luminosidad, F=flujo de fotones

Y se ajustan los parámetros cosmológicos usando un chi-cuadrado





Oscilaciones acústicas de bariones (BAO)

- **Las pequeñas sobredensidades iniciales en el universo (de DM & bariones) son también sobrepresiones que lanzan ondas sonoras esféricas (al 57% de la velocidad de la luz).**

- **Los fotones, que proporcionan la presión, se desacoplan en la recombinación.**

- **La velocidad del sonido cae rápidamente y las ondas se congelan a un radio de 150 Mpc.**

- **Se espera una sobredensidad de bariones at 150 Mpc y en el origen de la onda (DM). Ambas actúan como semillas en la formación de galaxias. Por tanto, se espera una acumulación de galaxias separadas por esta distancia.**

- La escala de las oscilaciones acústicas depende de Ω_M y Ω_B.

- Las anisotropías en la CMB fijan la escala de la oscilación a redshift ~1100.

- ¡Esta distancia es una regla estándar!


Dark Matter, Gas, Photon, Neutrino
110 yrs
z=82507
Mass Profile of Perturbation
0.6
0.4
0.2
0
0
50
100
150
200
Radius (Mpc)

From M. White

Oscilaciones acústicas de bariones (BAO)

Medir la posición y el redshift de las galaxias y calcular la función de correlación.

Esta es una técnica novedosa, probada muy recientemente (de forma parcial) in SDSS. Se supone que está menos afectada por errores sistemáticos que otras pruebas de la energía oscura.

A z~0.35, la escala BAO medida es 148 Mpc.

En perfecto acuerdo con lo predicho por el modelo con energía oscura a partir de los resultados en la CMB



Número de cúmulos de galaxias

El número de cúmulos de galaxias como función del ángulo sólido y del redshift es muy sensible a los parámetros cosmológicos, y en especial a la energía oscura.

La sensibilidad viene del crecimiento del elemento de volumen y de la formación de estructuras en función del redshift.



FIG. 2.—SZE (contours) and X-ray (color scale) images of each cluster in our sample. Negative contours are shown as solid lines. The contours are multiples of 2 σ and the FWHM of the synthesized beams are shown in the bottom left corner. The X-ray color scale images are raw counts images smoothed with Gaussians with $\sigma = 15''$ for PSPC data and $\sigma = 5''$ for HRI data. There is a color scale mapping for the counts above each image. The 30 GHz image statistics are summarized in Table 4.



From J. Mohr

Efecto lente gravitacional débil (weak lensing)



Mide la distorsión de las imágenes por la materia que hay entre la fuente y el observador

Los efectos de distoorsión por weak lensing son del orden del 1%



Weak Lensing

Los efectos de magnificación y distorsión debidos al weak lensing se usan para medir las propiedades de la distribución de materia entre el observador y las fuentes. Tanto de la materia ordinaria como de la materia oscura.

Weak lensing is sensitive to cosmology through distances and the growth factor.



Situación actual: Supernovae



From arXiv:0802.4154 [astro-

ΛCDM describe los datos de supernovae. Es importante destacar que se observa tanto la época reciente de aceleración como la época previa de deceleración. La transición ocurre en torno a z~0.8

Situación actual: CMB



WMAP3+ACBAR: 5 picos del espectro de potencias detectados

Situación actual: Cosmología ΛCDM

Todas estas medidas juntas confirman el modelo ΛCDM para la cosmología con la energía oscura y la materia oscura dominando el contenido energético del cosmos





La cosmología es un campo extraordianriamente activo... Una lista parcial de proyectos

- **Proyectos activos o terminados recientemente**
  - Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT) SuperNova Legacy Survey (SNLS)
  - Equation of State:SupErNovae trace Cosmic Expansion… (ESSENCE)
  - Sloan Digital Sky Survey (SDSS) II
  - Subaru Carnegie Supernova Project (CSP)
  - Supernova Factory
  - Anglo-Australian Telescope (AAΩ) WiggleZ
  - Hubble Space Telescope (HST)
  - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)
- Proyectos en el futuro muy cercano (1-3 años)
  - Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System (PanSTARRS)
  - South Pole Telescope (SPT)
  - Dark Energy Survey (DES)
  - Baryon Oscillation Sky Survey (BOSS)
  - Hobby-Eberly Telescope dark Energy Experiment (HETDEX)
  - Planck
- Proyectos planeados
  - Large Synoptic Survey Telesope (LSST)
  - Gemini Wide Field Multi-Object Spectrograph (WFMOS)
  - Joint Dark Energy Mission (JDEM) (ADEPT, DESTINY, SNAP, etc.)
  - EUCLID
  - Square Kilometer Array (SKA)



COSMIC TIMELINE shows the Dark Ages sandwiched between the release of the microwave background radiation and the formation of the first galaxies and stars. The period came to a gradual end as starlight streamed out and created the ionized gas that now dominates intergalactic space.



JEAN-FRANCOIS PODEVIN (*start of big bang*); MAX TEGMARK *Massachusetts Institute of Technology* (*WMAP*), NASA, EUROPEAN SPACE AGENCY, STEVEN BECKWITH *Space Telescope Science Institute* AND HUBBLE ULTRA DEEP FIELD TEAM (*ancient galaxies*); M. IYE AND K. OTA, © SUBARU TELESCOPE, NATIONAL ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF JAPAN (*IOK-1*); NASA/JPL (*M31*)

Conclusiones

El 95% del contenido energético del cosmos es desconocido

Confirmado cada vez con más datos y habrá más en el futuro cercano

Uno de los campos más activos de la ciencia actual

Se esperan grandes avances en los próximos años, quizás revolucionarios